

SUICÍDIO NA ADOLESCÊNCIA

Ana Paula Nunes Bento¹; Thiago Schroeder Branquinho Reis¹; Lucas Bastos Aranha Alves¹, Isabella Resende Coelho¹, Augusto Fleury Estrela¹, William Álvares²

¹ Discente do curso de Medicina do Centro Universitário de Anápolis- UniEVANGÉLICA

² Docente do curso de Medicina do Centro Universitário de Anápolis- UniEVANGÉLICA

RESUMO: Este artigo discute fatores de risco associados ao suicídio na adolescência, bem como características epidemiológicas de jovens que tentam ou efetivam o suicídio. Foram utilizados estudos nacionais sobre o tema, a partir dos quais foi possível identificar alguns fatores de risco que têm sido associados ao comportamento suicida, tais depressão, uso de drogas lícitas e ilícitas, exposição à violência, conflitos e antecedentes familiares e experiências estressoras. Ao observar as diferenças de gênero, notou-se que as tentativas de suicídio são mais frequentes em meninas, porém, o suicídio consumado é maior em meninos, pois eles utilizam-se de meios mais agressivos em suas tentativas. Logo, é importante que se tenha o conhecimento dos principais fatores de risco e expressão dos sinais associados ao suicídio entre adolescentes para que, assim, seja possível planejar, criar e executar programas de prevenção.

Palavras-chave:

Suicídio. Psiquiatria do adolescente. Epidemiologia. Fatores de risco. Ideação suicida.