

OS TRÊS PRINCIPAIS FATORES DE RISCO PARA ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO

Larissa Tavares da Silva¹, Mateus Tavares de Souza¹, Nathália Lima de Moraes Moruê¹, Karinne Ribeiro Dias¹, Victória Oliveira Prados¹, Wesley Gomes².

1- Discente do curso de Medicina do Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA.

2- Docente do curso de Medicina do Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA.

RESUMO: Este resumo expandido disserta sobre os três principais fatores de risco modificáveis para o acidente vascular encefálico (AVE). Essa doença é caracterizada por danos cerebrais causados por falta de irrigação sanguínea a partir de uma obstrução ou ruptura de vasos sanguíneos. Dentre os dois tipos de fatores de risco, o resumo enfoca a hipertensão arterial sistêmica, o tabagismo e a diabetes mellitus. Buscou-se em banco de dados cinco artigos para estudo da etiopatogenia da doença, além da comprovação de que hábitos de vida saudáveis podem diminuir as chances de se ter AVE. Corroboraram-se os dados de que os três principais fatores de risco citados acima aumentam à chance de se ter a doença, além da explicitação da influência desses fatores. Provou-se, ainda, a importância da prevenção primária nas Unidades Básicas de Saúde para diminuição dos casos de AVE.

Palavras-chave:

AVE. Fatores de risco. HAS. Diabetes mellitus. Smoking.