

## Análise do perfil clínico e epidemiológico dos casos de delirium durante a internação pela COVID-19

Eduardo Cerchi Barbosa<sup>1</sup>; Bruna Abreu Simões Bezerra Cunha<sup>1</sup>; Daniel de Barros Jesus<sup>1</sup>; Jordão Ribeiro Oliveira<sup>1</sup>; Maria Cristina Araújo Estrela<sup>1</sup>; Rebeca Miguel de Oliveira<sup>1</sup>; Cristiane Teixeira Vilhena Bernardes<sup>2</sup>

1. Discente do curso de Medicina da Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA.
2. Docente do curso de Medicina da Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA.

**RESUMO:** A pandemia da COVID-19 trouxe inúmeras mudanças para a realidade mundial e na vivência dos indivíduos. É uma doença que acomete o corpo de forma sistêmica, causando diferentes sintomas, de evoluções variadas, podendo levar à morte. Já o delirium é uma alteração cognitiva de início repentino, que se caracteriza por sintomas neurológicos e comportamentais, que agravam com a hospitalização. O presente estudo pretende descrever o perfil clínico e epidemiológico dos casos de delirium durante a internação pela COVID-19. Para isso, será realizado um estudo transversal de cunho descritivo, baseado na análise de prontuários e dados dos pacientes em hospital na cidade de Anápolis, Goiás. Serão incluídos no estudo prontuários de pacientes em UTI que foram internados por COVID-19 e apresentaram delirium, de ambos os sexos, maiores de 18 anos. Serão excluídas do trabalho os prontuários incompletos ou inacessíveis. Com relação aos resultados, espera-se encontrar dados referentes ao número de indivíduos que desenvolveram delirium enquanto estavam na UTI de vido à COVID-19 e associar com as outras causas de internação.

**Palavras-chave:**  
Delirium.  
COVID-19.  
Unidade de  
Terapia  
Intensiva.